

Bijlage II - Overzicht van toegelaten neonicotinoïde-houdende gewasbeschermingsmiddelen In Nederland

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Nederlandse toegelaten neonicotinoïde-houdende gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat voor alle toelatingen relevante risicoreducerende maatregelen zijn opgelegd. Het gaat hierbij onder andere om:

- Niet gebruiken van het middel op bloeiende gewassen ter bescherming van bijen en bestuivende insecten.
- Geen bij-aantrekkelijke gewassen zaaien of planten in de periode na uitplanten om bijen en bestuivende insecten te beschermen.
- Verplichte zuivering bij lozing van drainwater op oppervlaktewater om in het water levende organismen te beschermen.
- Direct onderwerken of beregenen na uitzaaien om vogels en zoogdieren te beschermen.
- Driftreducerende maatregelen, zoals het gebruik van specifieke spuitdoppen en deflectoren om in het water levende organismen te beschermen.

In het EASAC-rapport wordt daarnaast ingegaan op het curatief danwel preventief toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Daar waar zaadbehandeling een preventieve toepassing betreft, kan een spuittoepassing zowel preventief als curatief worden toegepast. Het Ctgb beoordeelt de risico's van het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel en maakt in zoverre geen onderscheid in preventieve of curatieve toepassing.

Imidacloprid

Middel	Toepassing	Teelt
Merit Turf	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Onbedekte teelt - Spuittoepassing 	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sportvelden, inclusief golfterrein (tees, greens en/of fairways) en graszodenteelt. Op golfterreinen mag het middel niet buiten de tees, greens en fairways worden toegepast.
Sombrero	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Onbedekte teelt - Zaadbehandeling 	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een zaadbehandeling in de teelt van suikerbieten en voederbieten.
Potatoprid	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Onbedekte teelt - Grondbehandeling 	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van pootaardappelen, toegepast door middel van een grondbehandeling bij het potten.
Admire	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel in de bedekte als onbedekte teelt - Spuittoepassing 	Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel hop, appel, peer, vruchtgroenten, bloembol- en bloemknolgewassen (muv...), eerstejaars plantgoed van bijgoed van overige bloembollen en bloemknollen, dat in het najaar geplant wordt (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt.
Wopro Imidacloprid (parallele toelating van Admire)	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel in de bedekte als onbedekte teelt - Spuittoepassing 	Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel hop, appel, peer, vruchtgroenten, bloembol- en bloemknolgewassen (muv...), eerstejaars plantgoed van bijgoed van overige bloembollen en bloemknollen, dat in het najaar geplant wordt (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt.
Gaicho Tuinbouw	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Bedekte teelt ten behoeve van de onbedekte teelt - Zaadbehandeling 	Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een zaadbehandeling (inclusief dummy pill of Phyto-drip) in sla, andijvie, sluitkoolachtige, bloemkoolachtige, bladkoolachtige
Kohinor 700 WG	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel in de bedekte als onbedekte teelt - Spuittoepassing 	<ul style="list-style-type: none"> - in de teelt van appels en peren door middel van een gewasbehandeling met een maximum aantal behandelingen van één keer per seizoen, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei van appel en peer; - in de bedekte teelt van aubergine, courgette, komkommer, tomaat, Spaanse peper en paprika, met dien verstande dat het middel slechts

		<p>centraal met de voedingsoplossing c.q. door middel van directe kraanvak-injectie mag worden meegegeven, met dien verstande dat het middel op de dag van de oogst niet vóór de oogst mag worden toegepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bij de opkweek van plantmateriaal (bedekte teelt) van aubergine, courgette, komkommer, tomaat, Spaanse peper en paprika door middel van een gewasbehandeling; - in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen door middel van een gewasbehandeling en een druppelbehandeling. - in de bedekte teelt van bloembol-, knol-, knolbloem- en bolbloemgewassen door middel van een gewasbehandeling. - ten behoeve van de onbedekte teelt van: <ul style="list-style-type: none"> - bloembollen van lelie (vermeerderingsteelt), - plantgoed van gladiool, - eerstejaars plantgoed van bijgoed van overige bloembollen en bloemknollen - door middel van een dompelbehandeling, met dien verstande dat er geen bloei op het veld optreedt en dat er binnen 16 maanden na planten geen voor bijen aantrekkelijke gewassen geplant of gezaaid worden. In amaryllis, dahlia, hyacint, narcis, tulp, iris en krokus is toepassing niet toegestaan. - ten behoeve van de bedekte teelt van bloembol-, knol-, knolbloem- en bolbloemgewassen met uitzondering van grofbollige narcissen en lelie, door middel van een dompelbehandeling; - in de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten door middel van een gewasbehandeling;
--	--	--

Acetamiprid

Middel	Toepassing	Teelt
Gazelle	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>a. in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft;</p> <p>b. in de teelt van appels, peren en kersen;</p> <p>c. in de bedekte teelt van aubergine, tomaat, paprika en Spaanse peper;</p> <p>d. in de bedekte teelt van augurk, courgette, komkommer en andere vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil;</p> <p>e. in de teelt van bloembol-, bloemknol- en bolbloemgewassen;</p> <p>f. in de teelt van bloemisterijgewassen;</p> <p>g. in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten;</p> <p>h. in openbaar groen, met uitzondering van grasvegetaties;</p> <p>i. in de bedekte veredelings- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en bloemisterijgewassen.</p>

Thiacloprid

Middel	Toepassing	Teelt
Calypso Spray	<ul style="list-style-type: none"> - Niet-professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sierplanten in de tuin (in de volle grond) en op kamerplanten (binnenshuis).

Calypso vloeibaar	<ul style="list-style-type: none"> - Niet-professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>I.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sierplanten in de tuin b. rode-, witte-, zwarte-, blauwe en kruisbes c. loganbes, taybes, braam en framboos d. bloembol-, bloemknol- en bolbloemgewassen e. aardappelen f. appels, peren, pruimen en kersen g. aardbei h. bieten <p>II. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel als aangietb</p>
Calypso vloeibaar (afgeleide van bovenstaande calypso vloeibaar)	<ul style="list-style-type: none"> - Niet-professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>I. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de vollegrondsteelt van sierplanten in de tuin.</p> <p>II. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel als aangietbehandeling van kamerplanten</p>
Exemptor	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide in de pot- en containerteelt van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloemisterijgewassen, - Boomkwekerijgewassen, - Vaste planten,
Sonido	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Onbedekte teelt - Zaadbehandeling 	<p>Insectenbestrijdingsmiddel door middel van een zaadbehandeling in mais (wederszijdse erkenning)</p>
Calypso	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>I :Gewasbehandeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in de teelt van aardappel b. in de teelt van suikerbiet en voederbiet met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan c. in de teelt van granen d. in de onbedekte teelt van peulvruchten (inclusief landbouwerwtten, landbouwstambonen, veldbonen) met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan e. in de teelt van koolzaad, blauwmaanzaad, vezelvlas en mosterdzaad f. in de teelt van hennep met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan g. in de teelt van appels, peren, pruimen en kersen (onbedekt) (zie onderaan voor restricties) h. in de teelt van rode bes, witte bes, zwarte bes, kruisbes en blauwe bes, i. in de bedekte teelt van cranberry, vlierbes, bosbes (inclusief vossebes en veenbes), azarole, duindoorn, meidoorn, jochelbes, jostabes, en peerlijsterbes j. in de teelt van braam en framboos k. in de onbedekte teelt van loganbes en taybes l. in de teelt van aardbei met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan m. in de bedekte teelt van rozenbottel n. in bedekte teelt van aubergine, augurk, courgette, komkommer, paprika, pattison, Spaanse peper en tomaat o. in onbedekte teelt van sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, Chinese kool en Oosterse bladkolen p. in de teelt van koolrabi q. in de teelt van koolraap, knolraap, pastinaak, radijs, rammenas, rettich en daikon r. in de teelt van bos-, was- en winterpeen en Parijse wortel s. in de teelt van schorseneer t. in de teelt van rode biet u. in de teelt van knolselderij en wortelpeterselie v. in de teelt van witlof- en cichoreipennen met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan w. in de teelt van asperges met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan x. in de onbedekte teelt van bleekselderij en knolvenkel y. in de onbedekte teelt van bloembol-, bloemknol- en bolbloemgewassen met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan z. in de bedekte teelt van bloembol-, bloemknol- en bolbloemgewassen met dien verstande dat maximaal 3 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan aa. in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen bb. in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan cc. in de teelt van boomkwekerijgewassen <ul style="list-style-type: none"> i. in spullen met dien verstande dat langs oppervlaktewater maximaal 3 bespuitingen zijn toegestaan ii. in opzetters met dien verstande dat langs oppervlaktewater maximaal 980 liter spuitvloeistof per hectare mag worden verspoten

		<p>iii. in overige boomkwekerijgewassen met dien verstande dat langs oppervlaktewater maximaal 3 bespuitingen met maximaal 1100 liter spuitvloeistof zijn toegestaan</p> <p>dd. in de teelt van vaste planten met dien verstande dat langs oppervlaktewater maximaal 3 bespuitingen zijn toegestaan</p> <p>ee. in particuliere tuinen met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan</p> <p>ff. in openbaar groen met dien verstande dat maximaal 2 bespuitingen per seizoen zijn toegestaan</p> <p>gg. de veredeling en zaadteelt van overige akkerbouw-, groenten- en bloemisterijgewassen</p> <p>II Aangietbehandeling</p> <p>III Druppelbehandeling, mits toegepast na 1 maart:</p> <p>ii. in de teelt op substraat van aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat.</p>
Calypso (parallele toelating van de Calypso hierboven)	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	Zie hierboven.

Thiamethoxam

Middel	Toepassing	Teelt
Actara	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Spuittoepassing 	<p>I. Gewasbehandeling</p> <p>a. in de teelt van consumptie-, zetmeel- en poot aardappelen, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei</p> <p>b. in de bedekte teelt van bloembol-, knol- en bolbloemgewassen</p> <p>c. in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei of op gewassen die op het veld niet tot bloei komen</p> <p>d. in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen</p> <p>e. in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei of op gewassen die op het veld niet tot bloei komen</p> <p>f. in de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten</p> <p>II. Grondbehandeling</p> <p>a. ten behoeve van de teelt van consumptie-, zetmeel- en poot aardappelen</p>
Cruiser SB	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Onbedekte teelt - Zaadbehandeling 	Zaden van suikerbieten en voederbieten ter voorkoming van schade door insecten.
Cruiser 70 WS	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel - Zowel bedekt als onbedekt - Zaadbehandeling 	<p>Toegestaan is uitsluitend het gebruik als zaadbehandelingsmiddel ter voorkoming van schade door insecten voor de behandeling van zaden van:</p> <p>a. sla (met uitzondering van veldsla) en andijvie, met dien verstande dat er binnen een periode van een jaar (365 dagen) gerekend vanaf het uitplanten op het veld geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant</p> <p>b. sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool, met dien verstande dat er voor Chinese kool binnen een periode van 7 maanden en voor boerenkool binnen een periode van 5 maanden gerekend vanaf het uitplanten op het veld geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant</p>

Clothianidine

Middel	Toepassing	Teelt
Poncho Beta	<ul style="list-style-type: none">- Professioneel- Onbedekte teelt- Zaadbehandeling	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten ter voorkomen van schade door insecten.