



Bayer CropScience

Gazon-Insect  
Voorstel Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing

Study Completion Date  
2011-04-18

Report (Study) Number  
5.1.2.e 20110035

Author(s)

5.1.2.e

Bayer CropScience B.V  
Energieweg 1  
3641 RT Mijdrecht

## OWNERSHIP STATEMENT

This document, the data contained in it and copyright therein are owned by Bayer CropScience. No part of the document or any information contained therein may be disclosed to any third party without the prior written authorisation of Bayer CropScience.

A.

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in het gazon, door middel van een aangietbehandeling met dien verstande dat het middel maximaal één keer per jaar wordt toegepast.

*Gevaarlijk voor bijen en hommels. Bijen en hommels bezoeken bloeiende gewassen (inclusief bloeiende onkruiden) om voedsel te verzamelen. Om de bijen en hommels te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid (bijvoorbeeld klaver in gazon). Verwijder onkruid voordat het bloeit.*

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen (gazons) die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien niet gegoten wordt op de strook van 1 meter breed grenzend aan het oppervlaktewater (sloot / vijver/etc.)

Het middel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

B.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### **Algemeen**

Gazon-Insect is speciaal ontwikkeld om door middel van een aangiet behandeling zowel engerlingen (o.a. larve van de meikever) als emelten (larven van de langpootmug) te kunnen bestrijden.). Door preventief aanbrengen van het middel op het gazon wordt vergeling of zelfs het plaatselijk afsterven van het gazon voorkomen.

Maai het gazon de dag voor de toepassing of vlak voor de toepassing. Breng het middel aan op een windstille, droge dag als de aarde een beetje vochtig is. Pas het middel niet toe bij helder, zonnig weer. Pas het middel tevens niet toe op een drijfnat of juist zeer droog gazon, aangezien de effectiviteit van het middel onder deze omstandigheden vermindert. Het meest geschikte moment om het middel aan te brengen is aan het begin van de avond. Nadat het middel is aangebracht, dient het gazon onmiddellijk te worden beregend (5 tot 15 liter water per m<sup>2</sup>. Dit beregenen is nodig om het middel door de gras/bodem laag heen te transporteren. Voorkom dat meer dan 15 l/m<sup>2</sup> wordt aangebracht.

Attentie:

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende planten, bijvoorbeeld om door luizen afgescheiden honingdauw te verzamelen.

### **Behandeling van het gazon**

Gazon, ter bestrijding van engerlingen (larven van de meikever), zodra aantasting wordt waargenomen of wanneer aanwezigheid van engerlingen is geconstateerd. Voor een optimale behandeling wordt het middel aangebracht in mei of juni wanneer volwassen meikevers gesignaleerd worden (tijdens de legperiode) .

Dosering: 3 gram per 9 liter water voor 10 m<sup>2</sup>. Het middel gelijkmatig over het gazon verdelen met behulp van een gieter, voorzien van een hiervoor geschikte verdeler.

Gazon, ter bestrijding van emelten (larven van de langpoot mug), zodra langpoot muggen worden waargenomen boven of op het gras. Dit is meestal rondom half augustus tot september (tijdens de legperiode).

Dosering: 3 gram per 9 liter water voor 10 m<sup>2</sup>. Het middel gelijkmatig over het gazon verdelen met behulp van een gieter, voorzien van een hiervoor geschikte verdeler