

Besluitvormingsdocument Herbeoordeling van het risico voor bijen door neonicotinoïden en fipronil
22-6-2011

In de Tweede Kamer is op 17 februari 2011 motie 19 aangenomen. Deze motie betreft de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden voor het onderdeel (subletale) effecten op bijen. Naar aanleiding van deze motie is voor de stoffen imidacloprid, thiomethoxam, clothianidine en fipronil het risico voor de bijen herbeoordeeld.

De notitie volgt de indeling van de beoordelingen van de verschillende stoffen (zie documenten Background). In deze Background documenten zijn de wijzigingen t.o.v. de Collegevergadering van 15 juni jongstleden in geel gemarkeerd. Wijzigingen in WGGA's zijn groen gemarkeerd. Allen de WGGA's waarin wijzigingen worden voorgesteld zijn bijgevoegd.

Per stof is er een overzicht opgenomen van de besluitvorming van het College per middel.

In de brief van het Ctgb d.d. 20 mei aan de Staatssecretaris van EL71, de heer Bleker, is toegezegd dat de staatssecretaris uiterlijk 30 juni de volgende resultaten van de herbeoordeling kan verwachten:

- besluiten op vrijwillige aanvraag tot wijziging van de toelating op basis van art. 41, lid 2 WGB;
- voorgenomen besluiten tot ambtshalve wijziging van de toelating op basis van art. 41, lid 3 WGB;
- besluit tot tijdelijk verbod of tijdelijke inperking van het gebruik en het voorhanden hebben van het middel op basis van art. 40, lid 3 WGB;
- beslissingen van het College om op dat moment niet ambtshalve in te grijpen in de toelating.

Daarnaast zal advies worden uitgebracht over de middelen, die tijdelijk zijn verboden, bij besluit Schorsing niet-professioneel gebruik insectenmiddelen, d.d. 6 juni 2011.

In dit besluitvormingsdocument zijn de voorstellen voor deze besluiten, beslissingen en adviezen opgenomen.

I

1. CLOTHIANIDIN

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin

toelating nr	Middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing(en)
13044	PONCHO BETA	Bayer CropScience B.V.	clothianidine 400G/L # beta-cyfluthrin 53,3G/L	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in bieten
13276	PONCHO ROOD	Bayer CropScience B.V.	clothianidine 600G/L	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in snij- en korrelmaïs

Er zijn geen biociden en geen niet-professionele middelen toegelaten op basis van clothianidin.

In de risicobeoordeling voor bijen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin worden de volgende blootstellingsroutes in ogenschouw genomen:

Risk assessment for bees

A.1.2 Professional uses of plant protection products: seed treatments

Direct exposure

1) *In-field*

Geen bespreekpunten

2) *Off-field - dust from treated seed*

"it is concluded that the long-term effects on honeybee colonies after exposure to dust from maize sowing are acceptable. This conclusion should be confirmed by statistical analysis of the data. The applicant is therefore requested to submit this statistical analysis of the data. This should be performed in consultation with Ctgb and the evaluator of the studies and should be submitted with the final reports of the monitoring studies which are still running. As the final reports of the studies which are still running are expected in autumn 2011, the submission date is proposed to be December 2011."

Voorstel:

Het College besluit

Indirect exposure via systemic working mechanism

1) *Residues in nectar and pollen of the treated crops*

Geen bespreekpunten

2) *Flowering weeds*

Geen bespreekpunten

3) *Succeeding crops*

Geen bespreekpunten

4) *Guttation*

Geen bespreekpunten

Public literature:

Geen bespreekpunten

Conclusie/acties College

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	toepassing	formulering	Toepassing(en)	Collegebesluit
13044	PONCHO BETA	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in bieten	Geen wijziging in bestaande toelating
13276	PONCHO ROOD	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in snij- en korrelmaïs	Geen wijziging in bestaande toelating

Voorstel College:

Het College stelt vast dat het middel PONCHO ROOD voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van de levering van genoemde data en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel PONCHO BETA voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van de levering van genoemde data en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

2. Thiamethoxam

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiamethoxam

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing
12679	ACTARA	Syngenta Crop Protection B.V.	thiamethoxam 25%	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in aardappelen, bedekte teelt van knol- en bolbloemgewassen, onbedekte en bedekte teelt van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten; Grondbehandeling van aardappelen.
12913	CRUISER 350 FS	Syngenta Crop Protection B.V.	thiamethoxam 350G/L	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Zaadcoating in mais, erwten, peulen, kapucijners.
12863	CRUISER SB	Syngenta Crop Protection B.V.	thiamethoxam 600G/L	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Zaadcoating in bieten.
12852	CRUISER 70 WS	Syngenta Crop Protection B.V.	thiamethoxam 70%	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in sla en andijvie.
13215	AXORIS QUICK-GRAN	Compo Benelux N.V.	thiamethoxam 12,00G/KG	Niet-professioneel	Granulaat	Granulaat voor in potten en bakken van sierplanten binnenshuis.
13216	AXORIS QUICK-STICKS	Compo Benelux N.V.	thiamethoxam 12,00G/KG	Niet-professioneel	Plantenstaafje	Pin voor in potten en bakken van sierplanten binnenshuis.

Biociden op basis van thiamethoxam

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing
13399	AGITA 10 WG	Novartis Consumer Health B.V.	thiamethoxam 10%	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverslijfplaatsen.

Risk assessment for bees.

A.1.1 Professional uses of plant protection products: spray treatments: Actara

Direct exposure via spray

1) In-field risk

Geen bespreekpunten

2) Off-field risk

For high tree nursery crops, no default drift mitigation measures have been laid down in the Evaluation Manual. However, after consultation with PRI in April 2011 it was determined that the following measure can be used in high tree nursery to achieve a drift level below the required level of 1%: a 5 m spray free zone in the crop in combination with a 5 m zone outside the crop on which no flowering plants may be present. The 5 m spray free zone is based on the *Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij* (LOTV). The 5 m flower free zone is based on calculations of PRI.

The following sentences should be added to the Statutory Instructions for use of Actara:

Om bijen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen:

In aardappels:

- ***conventionele spuitmachine met een lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme spuitdop en een kantdop; of***
- ***conventionele spuitmachine met een lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop; of***
- ***conventionele spuitmachine met een driftarme spuitdop en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning.***

In bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten (tegen luis), met uitzondering van laanbomen:

- ***conventionele spuitmachine met een lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme spuitdop en een kantdop; of***
- ***conventionele spuitmachine met een lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) en een driftarme Venturidop + kantdop; of***
- ***conventionele spuitmachine met een driftarme spuitdop en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning.***

In boomkwekerijgewassen (laanbomen) (tegen luis):

Het middel in de onbedekte teelt van hoge boomkwekerijgewassen niet toepassen in de buitenste 5 meter van het gewas; daarnaast dienen op een strook van 5 meter vanaf het midden van de laatste bomenrij geen bloeiende planten aanwezig te zijn.

With these restrictions, the risk to bees from direct exposure in the off-field area is acceptable.

Voorstel College:

Het College stelt vast dat het middel ACTARA voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde

restrictie en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Indirect exposure via systemic working mechanism

Nectar and pollen of the crop

Since there are currently no data available to estimate the long-term effects via systemic uptake after spraying, the applicant proposes to restrict the application of Actara for outdoor uses to “after flowering only”. With this restriction, exposure via flowering crops can be excluded and this risk is acceptable.

The following sentences must be included in the Statutory Instructions for Use:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel als

I. Gewasbehandeling

- in de teelt van consumptie-, zetmeel- en poot aardappelen, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei

- in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei

- in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei

Voorstel College:

Het College stelt vast dat het middel ACTARA voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde restrictie en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Nectar and pollen of weeds

Geen bespreekpunten

Nectar and pollen in succeeding crops

The French authorisation agency, ANSES, concluded in a preliminary risk assessment (not yet available online) that a waiting period of 3.5 months (104 days) is sufficient to protect honeybees from risks via attractive succeeding crops. They state that at day 104, 119 and 180 only a single exceedance was calculated by ANSES for pollinators consuming extreme high amounts of nectar and this will not affect the development of a bee colony because of the large size of the bee colonies.

Ctgb can agree with the proposed 3.5 months waiting period in view of the worst-case assumptions used for the calculations (residue in the plant used as estimate for residue in nectar; extreme value for nectar consumption used) and the fact that after 119 days (4 months) the worst-case calculated risk is acceptable, and having in mind harmonisation of restrictions within EU.

Thus, Ctgb agrees with the proposal of the applicant to add the following restriction to the label:

In verband met het risico voor bijen mogen binnen 3,5 maand na toepassing van Actara geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant.

With this restriction, the risk from succeeding crops is acceptable.

Voorstel College:

Het College stelt vast dat het middel ACTARA voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde restrictie en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Honeydew

Geen bespreekpunten

Guttation

Geen bespreekpunten

A.1.2 Professional uses of plant protection products: seed treatments (Cruiser 350FS, Cruiser SB, Cruiser 70 WS)

- Direct exposure

1) *In-field*

Geen bespreekpunten

2) *Off-field - dust from treated seed*

Geen bespreekpunten

Indirect exposure via systemic working mechanism

Exposure via nectar and pollen of flowering crops

a) *maize-*

Geen bespreekpunten

b) *peas*

Based on the long term monitoring studies in both maize and oilseed rape with long exposure time in which colony survival and condition was not affected, no adverse lethal and sublethal effects are expected in peas and the risk is therefore acceptable. The applicant should submit confirmatory data (e.g. residue data in pea nectar/pollen) that the monitoring trials indeed cover the exposure expected from pea nectar and pollen. The proposed submission date for this is autumn 2012, considering the time needed for a residue trial.

Flowering weeds

Geen bespreekpunten

Succeeding crops

"It is therefore proposed to add the following warning to the label of Cruiser 70 WS (for all uses) and Cruiser 350 FS (for peas):

In verband met het risico voor bijen mogen binnen een periode van een jaar (365 d) gerekend vanaf zaai of uitplanten op het veld geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant.

With this sentence, the risk from succeeding crops is acceptable for all seed treatment uses of thiamethoxam."

Het College stelt vast dat het middel Cruiser 70 WS voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde restrictie en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Het College stelt vast dat het middel Cruiser 350 FS voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde

restrictie voor toepassing in erwten en van de levering van genoemde data voor toepassing in erwten en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Guttation

Geen bespreekpunten

Honeydew

Geen bespreekpunten

A.2 Non-professional plant protection uses

Geen bespreekpunten

Biociden

B.1 Professional biocidal uses

Geen bespreekpunten

Public literature:

Geen bespreekpunten

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	toepassing	formulering	Toepassing	Collegebesluit
12679	ACTARA	Syngenta Crop Protection B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in aardappelen, bedekte teelt van knol- en bolbloemgewassen, onbedekte en bedekte teelt van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten; Grondbehandeling van aardappelen.	wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder
12913	CRUISER 350 FS	Syngenta Crop Protection B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Zaadcoating in mais, erwten, peulen, kapucijners.	wijziging WGGA op verzoek (erwten) toelatinghouder en levering data (erwten)
12863	CRUISER SB	Syngenta Crop Protection B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Zaadcoating in bieten.	Geen wijziging in bestaande toelating
12852	CRUISER 70 WS	Syngenta Crop Protection B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in sla en andijvie.	wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder
13215	AXORIS QUICK-GRAN	Compo Benelux N.V.	Niet-professioneel	Granulaat	Granulaat voor in potten en bakken	Geen wijziging in bestaande

			neel		van sierplanten binnenshuis.	toelating
13216	AXORIS QUICK-STICKS	Compo Benelux N.V.	Niet-professioneel	Planten-staafje	Pin voor in potten en bakken van sierplanten binnenshuis.	Geen wijziging in bestaande toelating

Biociden op basis van thiamethoxam

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	toepassings	formulering	Toepassing	Collegebesluit
13399	AGITA 10 WG	Novartis Consumer Health B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverblijfplaatsen.	Geen wijziging in bestaande toelating

Voorstel College

Het College stelt vast dat het middel Axoris Quick Gran voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel Axoris Quick Sticks voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel CRUISER SB voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel AGITA 10WG voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

3/ FIPRONIL

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van fipronil

toelating nr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	dosering	toepassing	formulering	Toepassing
12802	MUNDIAL	BASF Nederland B.V.	fipronil 500G/L	1x 5-20 g a.s./ha	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in bloemkool, boerenkool, broccoli, rodekool, savooienkool spitskool, spruitkool en witte kool.
12977	MUNDIAL	LTO Nederland (LTO coördinator middelenpakket vollegrondsgroenten)	fipronil 500G/L	1x 5-15 g a.s./ha	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in Chinese kool, Oosterse bladkolen en koolrabi.
13384	MUNDIAL	Productschap Akkerbouw	fipronil 500G/L	1x 100 g a.s./ha	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	zaadcoating in uien en sjalotten

Biociden op basis van fipronil

toelating nr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing
12119	GOLIATH AASSTATI ONS	BASF Nederland B.V.	fipronil 0,05%	Professioneel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen.
12120	GOLIATH GEL	BASF Nederland B.V.	fipronil 0,05%	Professioneel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen.

Er zijn geen niet-professionele middelen toegelaten op basis van fipronil.

A.1 Professional uses of plant protection products (Mundial)

Risk assessment for bees

Direct exposure via spray

Geen bespreekpunten

Direct exposure via dust drift

Geen bespreekpunten

Indirect exposure via systemic working mechanism

- Exposure via nectar/pollen (flowering crops, weeds or succeeding crops)

Risk to adult bees

Geen bespreekpunten

Risk to bee brood

Geen bespreekpunten

- Exposure via honeydew

To address the risk in cabbages, the applicant submitted an extended laboratory study (in which exposure of honeybees to honeydew obtained from aphids on potato leaves from potato plants grown on fields treated with fipronil 0.5% granular bait (50 mg a.s./ha) in Spain (N & S) was studied) and an extensive statement. They conclude that the risk is expected to be low, but as an extra precaution propose to exclude the formation of honeydew on the label by including a restriction sentence. Since this sentence will exclude exposure, the study and statement are not discussed here. The risk via honeydew in cabbages is acceptable based on the restriction (*Aphids need to be controlled in such a way so no honeydew will be formed*). Cabbage seeds or plants are treated indoors, while the risk via honeydew occurs on the field after plants have been distributed to growers. Therefore, the applicant of the product should make sure that the persons buying the treated seeds or plants are aware that honeydew has to be avoided.

Thus, the risk for bees through exposure via honeydew as a result from seed treatment with Mundial in cabbages, onions and shallots is acceptable, provided that the following restriction sentence is placed on the label for the uses in cabbages:

De toepasser dient de afnemer van zaden en/of planten ervan op de hoogte te stellen dat bladluizen zodanig bestreden moeten worden dat er geen hoeveelheden honingdauw worden gevormd waar bijen op afkomen.

Het College stelt vast dat het middel Mundial (toelatingnummers 12802, 12977) voldoet aan de toelatingcriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb onder voorwaarde van voorgestelde restrictie en besluit in te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de toelating op verzoek van de toelatinghouder op basis van art. 41, lid 2 WGB;

Collegevraag 15 juni : Hoe is voor gebruiker te checken of er honingdauw gevormd kan worden. Is dit voor toepasser helder?

Door de nVWA is aangegeven dat in de praktijk duidelijk is wanneer er sprake kan zijn van situaties dat er honingdauw kan worden gevormd.

- Exposure via guttation

Geen bespreekpunten

B. Biocides

B.1 Professional uses of biocides (Goliath Aasstations, Goliath gel)

Geen bespreekpunten

Public literature:

Geen bespreekpunten

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	toepassing	formulering	Toepassing	College
12802	MUNDIAL	BASF Nederland B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaad behandeling	zaadcoating in bloemkool, boerenkool, broccoli, rodekool, savooienkool spitskool,	wijziging WGGGA op verzoek toelatinghouder

					spruitkool en witte kool.	
12977	MUNDIAL	LTO Nederland (LTO coördinator middelenpakk et vollegrondsgroenten)	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaad behandeling	zaadcoating in Chinese kool, Oosterse bladkolen en koolrabi.	wijziging WGGGA op verzoek toelatinghouder
13384	MUNDIAL	Productschap Akkerbouw	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaad behandeling	zaadcoating in uien en sjalotten	Geen wijziging in bestaande toelating
12119	GOLIATH AASSTATIONS	BASF Nederland B.V.	Professioneel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen.	Geen wijziging in bestaande toelating
12120	GOLIATH GEL	BASF Nederland B.V.	Professioneel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen.	Geen wijziging in bestaande toelating

Het College stelt vast dat het middel Goliath Aasstations voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel Goliath GEL voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

Het College stelt vast dat het middel Mundial 13384 voldoet aan de toelatingscriteria voor bijen vastgelegd in artikel 28 van de Wgb en beslist derhalve dat er op dit moment geen reden is tot ambtshalve ingrijpen in de toelating op grond van artikel 40 en 41 van de Wgb.

4/ IMIDACLOPRID

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing(en)
12942	ADMIRE O-TEQ	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 350G/L	Professioneel	Olie dispersie	Gewasbehandeling in appel en peer, vruchtgroenten onder glas, bloemisterijgewassen buiten en onder glas, bloembol- en bloemknol, boomkwekerij en vaste planten, hop, pennenteel van witlof.
11483 (parallel: 11547, 13363)	ADMIRE	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 70%	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in appel en peer, vruchtgroenten onder glas, bloemisterijgewassen buiten en onder glas, bloembol- en bloemknol, boomkwekerij en vaste planten.
13178	ADMIRE	LTO Nederland	imidacloprid	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Traybehandeling (kort voor planten) of fytodrip (bij zaaien) in spruitkool, bloemkool en broccoli.
13059	MONAMI	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 17,5G/L # pencycuron 250G/L	Professioneel	Suspensie concentraat	Aardappelen, grondbehandeling tijdens poten.
11662	AMIGO FLEX	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 350G/L	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Aardappelen, grondbehandeling tijdens poten.
13321	MERIT TURF	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 0,5%	Professioneel	Granulaat	Strooien in grasvegetatie en graszodenteelt.
11455	GAUCHO	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 70%	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in suiker- en voederbieten.
11601	GAUCHO ROOD	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 70%	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in mais.
12341	GAUCHO TUINBOUW	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 70%	Professioneel	Water dispergeerbaar	Zaadcoating van sla, andijvie, kolen, prei.

					poeder voor vochtige zaadbehandeling	
11998 (afgeleide: 12219)	ADMIRE N PIN	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 2,5%	Niet-professioneel	Plantenstaafje	Sierplanten in potten en bakken.
12115 (afgeleides: 12945, 12919)	PROVADO GARDEN	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 5%	Niet-professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in siergewassen en appels en peren of particuliere boomgaard, en aangietbehandeling in gazon.

Biociden op basis van imidacloprid

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	werkzame stoffen	toepassing	formulering	Toepassing(en)
13160 (afgeleide: 13173)	LURECTRON FLYBAIT	Denka Registrations B.V.	imidacloprid 0,5%	Professioneel	Granulaat	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverblijfplaatsen.
12665 (afgeleide: 13063)	QUICK BAYT	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 0,5%	Professioneel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverblijfplaatsen.
13116	QUICK BAYT SPRAY	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 10%	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Tegen vliegen. Middel verspuiten op oppervlakten waar vliegen vaak zitten. Dierverblijfplaatsen en opslagplaatsen.
13074	MAXFORCE QUANTUM	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 0,31G/KG	Professioneel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Tegen mieren. Gel (visceuze druppels), met een pistool binnen of buiten, in nesten of op looppaden aan te brengen.
13250	MAXFORCE PRIME	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 2,15%	Professioneel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen en transportmiddelen. Gel aanbrengen in kieren en spleten.
12094	MAXFORCE WHITE IC	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 2,15%	Professioneel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen en transportmiddelen. Gel aanbrengen in kieren en spleten.
13055 (afgeleides: 13104, 13127, 13073,	PIRON MIERENLOKD OOS	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 0,03%	Professioneel & Niet-professioneel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Mierenlokdoos. Zowel buiten als binnen.

13072, 13121, 13124) 12952 (afgeleides: 13026, 12974, 13052, 12979, 12980, 12024)	BAYTHION MIERENMIDDE L N	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 0,0500%	Professioneel & Niet- professioneel	Granulaat	Korrels om bij mierennest te strooien. Alleen buiten.
13280 (parallel: 13351)	VAPONA RAAMSTICKER	Sara Lee Household and Body Care NL B.V.	imidacloprid 0,4890%	Niet- professioneel	Diversen	Sticker tegen vliegen. Binnenshuis.
13369	VLIEGENSTICK ER	Bayer CropScience B.V.	imidacloprid 5G/KG	Niet- professioneel	Diversen	Sticker tegen vliegen. Binnenshuis.

A.1 Professional uses of plant protection products

A.1.1 Professional uses – spray application: Admire, Admire O-Teq

Direct exposure via spray

1) *In-field risk*

1a) *Glasshouse uses*

Bespreekpunt 1: “To protect bees in glasshouses, restrictions can be included. Exposure to both introduced bees (for pollination service) and bees flying into greenhouses from the outside should be avoided. With the appropriate restriction sentences, the direct risk is considered to be acceptable for the glasshouse uses:

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Voorstel College: wijziging WG/GA op verzoek van toelatinghouder.

Collegevraag 15 juni: is deze restrictiezin uitvoerbaar? nVWA acht deze restrictiezin inderdaad uitvoerbaar, handhaafbaar en naleefbaar.

Bespreekpunt 2: The applicant proposes a two-month waiting period for tomato and bell pepper. For the other crops in greenhouses in which pollinators may be used (courgette, gherkin, aubergine and pepper, no waiting period is necessary according to the applicant based on experience in practice.

However, consultation with pollinator-producing companies Koppert and Biobest and with IPM consultancy IPM Impact showed that side-effects on pollinators from imidacloprid may occur and the appropriate waiting period will depend on many variables such as the crop, the method of application (foliar spray/soil/substrate), the weather (temperature, sunlight), the crop stage *etc.*, and may vary from 14 days to 10 weeks to even longer. Therefore, it is not possible to give specific advice on the label about a waiting period. A generic warning should be indicated on the label:

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden voor overige gewassen.

With this addition to the Statutory Instructions for Use, the risk to pollinators in greenhouse is acceptable.

Voorstel College: in stemmen met wijziging WG/GA op verzoek van toelatinghouder

1b) *Field uses*: geen spreekpunt

2) Off-field risk:

“Table E.5 shows that drift reduction measures to protect bees are only necessary for the uses in apple and pear.

In an earlier risk assessment of Admire and Admire O-Teq, mitigation measures for apple and pear were also prescribed to protect aquatic organisms. These are prescribed only for fields bordering water bodies. For reasons of clarity, all restriction sentences for both aquatic organisms and bees are given here.

The following must be stated in the statutory instructions for use:

Om in het water levende organismen en bijen te beschermen is toepassing in de teelt van appel en peer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen:

Vóór 1 mei (kaal)

- ***Venturidop + éézijdige bespuiting laatste bomenrij; ventilatorstand uit.***
- ***Wannerspuit met reflectiescherm + venturidop.***

Vanaf 1 mei (volblad)

- ***Tunnelspuit.***
- ***Combinatie windhaag op de rand van het rijpad en éézijdige bespuiting van de laatste bomenrij.***
- ***Venturidop + éézijdige bespuiting laatste bomenrij; ventilatorstand aan.***
- ***Wannerspuit met reflectiescherm + venturidop.***

Om bijen te beschermen is toepassing in de teelt van appel en peer op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen:

Vóór 1 mei (kaal)

- ***Tunnelspuit.***
- ***Dwarsstroomspuit + venturidop + éézijdige bespuiting laatste bomenrij.***
- ***Wannerspuit met reflectiescherm.***

Vanaf 1 mei (volblad)

- ***Tunnelspuit.***
- ***Dwarsstroomspuit + éézijdige bespuiting laatste bomenrij.***
- ***Dwarsstroomspuit + reflectiescherm.***
- ***Dwarsstroomspuit + sensorbesturing.***
- ***Wannerspuit met reflectiescherm.***

With these restrictions, risk to bees is acceptable from exposure in the off-field area for all uses of Admire and Admire O-Teq.”

Voorstel College: in stemmen met wijziging WG/GA op verzoek van toelatinghouder

Indirect exposure via systemic working mechanism

1) Nectar and pollen of the crop

1a) Foliar spray uses

Orchards: geen bespreekpunten

Flowering ornamentals

However, based on the studies in orchards and the translocation behaviour in the plant of the a.s. after spraying (see above), the substance will not occur in flowers when the flower buds have not been sprayed. Therefore, spraying in flowering ornamentals is only allowed before flower buds are visible and after flowering. The Statutory Instructions for Use should state (only relevant uses included):

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen door middel van een gewasbehandeling, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan vóór de bloemknoppen zichtbaar zijn alsmede na de bloei;

in de onbedekte teelt van en ten behoeve van de teelt van bloembol-, knol-, knolbloem- en bolbloemgewassen door middel van een gewasbehandeling, met dien verstande dat de toepassing uitsluitend plaatsvindt vóór de bloemknoppen zichtbaar zijn alsmede na de bloei of na het koppen

in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten door middel van een gewasbehandeling, met dien verstande dat in gewassen die in bloei kunnen komen toepassing alleen is toegestaan vóór de bloemknoppen zichtbaar zijn alsmede na de bloei.

Voorstel College: instemmen met wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder

1b) Dipping applications

The label currently states that *flowering has to be avoided* for bulbs in the field which have had a dip treatment. 'Bulbs' comprises a large range of crops. For all flower crops belonging to the 'bulb' category it was investigated whether it is possible in practice to avoid flowering (in consultation with nVWA and bulb experts).

For Hyacinth, Crocus and Narcis, flowers are never removed (not for bulb production nor for flower production) and exposure on the field to these flowers can therefore not be excluded. For the broad category of 'bijgoed', the same conclusion holds.

For Tulip bulb production, flowers will be removed some time after flowering so exposure cannot be excluded. For Dahlia, Lily and Gladiolus bulb production, in practice it is difficult to remove flowers and exposure cannot be excluded. When these bulbs are grown for flower production, flowering may occur on the field (at least for a short period, until the flowers are harvested to be sold).

For Allium, Hippeastrum (Amaryllis) and Iris, flowers are removed before flowering when the bulbs are grown for bulb production. However, when bulbs are grown for flower production, flowering may occur on the field (at least for a short period, until the flowers are harvested to be sold).

Thus, for bulbs growing outdoors, exposure can only be excluded for **bulb** production of Allium, Hippeastrum and Iris.

The Statutory Instructions for Use need not be revised as they already state (only bulb dipping uses included):

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:

in de bedekte teelt van en ten behoeve van de teelt van bloembol-, -knol,

knolbloem- en bolbloemgewassen door middel van een dompelbehandeling, waarbij niet meer dompelvloeistof wordt gebruikt dan in de gebruiksaanwijzing is aangegeven, in de onbedekte teelt van en ten behoeve van de teelt van bloembol-, -knol, knolbloem en bolbloemgewassen door middel van een dompelbehandeling, met dien verstande dat bloei moet worden voorkomen en niet meer dompelvloeistof wordt gebruikt dan in de gebruiksaanwijzing is aangegeven;

Voorstel College: continueren huidige restrictiezin in WGGA

2) Nectar and pollen of weeds

The following sentence will be added to the bee restriction sentence:

Na een spuittoepassing percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Voorstel College: instemmen met wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder

3) Nectar and pollen in succeeding crops

“Therefore, Bayer CropScience proposes to adjust the label with waiting periods before planting a bee attractive flowering crop that are in line with the suggestions made by Ctgb in their draft evaluation”.

In accordance with Table E.6, the required waiting periods should be prescribed on the label. See the attached revised WG/GA. With these restrictions, the risk from succeeding crops is acceptable. “

Voorstel College: instemmen met wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder

NB voor betreffende wijzigingen, zie bijgevoegde WGGA's

4) Honeydew geen bespreekpunt

5) Guttation - geen bespreekpunt

A.1.2 Professional uses – other than spray application

A.1.2.1 Soil treatments

Tray treatment or phytodrip treatment: Admire

Direct exposure geen bespreekpunt

Indirect exposure -

1) Nectar and pollen of flowering crops geen bespreekpunt

2) Nectar and pollen of weeds geen bespreekpunt

3) Nectar and pollen of succeeding crops

“Thus, a waiting period of 6 months is required before bee-attractive succeeding crops can be planted. This would also cover the risks to bees in crop failure scenario's (note that crop failure is not considered relevant for the proposed crops).

Since the authorisation of Admire ends at 01/08/2011, a new label proposal was not submitted by the applicant. The need for a label change will be discussed.”

Voorstel College 15 juni: College beslist tot niet ingrijpen, de toelating loopt zeer binnenkort af. In verband met behoorlijk bestuur zal een voorstel door het College worden gedaan om voor de besluiten in het kader van de herbeoordeling van bijen een termijn te geven voor afhandeling van recalls en wijzigingen etiketten. Voorstel volgt.

4) *Honeydew* geen bespreekpunt

5) *Guttation* geen bespreekpunt

Soil treatment: Monami, Amigo Flex

Direct exposure geen bespreekpunt

Indirect exposure -

1) *Nectar and pollen of flowering crops* geen bespreekpunt

2) *Nectar and pollen of weeds* geen bespreekpunt

3) *Nectar and pollen of succeeding crops*

“for the proposed uses in potatoes, after 240 d (8 months) it can be said with certainty that the residue level in nectar and pollen of an untreated bee-attractive crop will be at or below a level that is harmless for bees.

The applicant has agreed to a waiting period of 8 months. The label will state:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik in de teelt van poot aardappelen, toegepast door middel van een grondbehandeling tijdens het poten, met dien verstande dat er binnen 8 maanden na toepassen geen voor bijen aantrekkelijke gewassen geplant of gezaaid worden.

With this restriction, the risk from succeeding crops is acceptable. “

Voorstel College: instemmen met wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder

4) *Honeydew*– geen bespreekpunt

5) *Guttation* – geen bespreekpunt

Granule on grass fields: Merit turf

Geen bespreekpunt

A.1.2.2 Seed treatments: Gaucho, Gaucho Rood, Gaucho Tuinbouw

Direct exposure – geen bespreekpunt

Indirect exposure via systemic working mechanism

1) *Nectar and pollen of the crop*- Geen bespreekpunt

2) *Nectar and pollen of weeds*- Geen bespreekpunt

3) *Nectar and pollen of succeeding crops*

Therefore, it is considered that a restriction is necessary for the use in lettuce and endive, not for maize, beets, cabbages and leek:

In verband met het risico voor bijen mogen binnen een periode van 10 maanden gerekend vanaf zaai of uitplanten op het veld geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant.

Based on the above, the risk from succeeding crops is acceptable.

Voorstel College: instemmen met wijziging van WG/GA op verzoek toelatinghouder

4) *Honeydew* - Geen bespreekpunt

5) *Guttation* - Geen bespreekpunt

A.2 Non-professional uses

Admire N Pin

Geen bespreekpunt

Provado Garden:

Provado Garden is used by non-professionals as a spray in ornamentals and apple and pear orchards and as a pouring use in lawns.

Direct exposure

In cases of direct exposure, imidacloprid is very toxic to bees. Therefore direct exposure should be avoided. If the product is not sprayed or poured on or near flowering plants, bees will not be exposed directly.

To prevent direct exposure, in the current label the following restriction sentence is indicated on the label:

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet gebruiken op of in de buurt van bloeiende planten en bloeiende onkruiden.

Punt van aandacht voor het College: Dit middel en twee afgeleide middelen zijn op 7 juni geschorst door Staatssecretaris Bleker. In de toelichting bij het besluit tot schorsing wordt aangegeven dat er ernstige twijfels blijven of de mitigerende maatregel het risico wel afdoende afdekt en dat er meer onderzoek nodig. De nVWA is gevraagd een advies uit te brengen over de uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van deze restrictiezin. Tevens is in een aantal lidstaten gevraagd hoe wordt omgegaan met deze particuliere toepassingen.

Indirect exposure

Flowering crops and flowering weeds

The applicant provided the following statement regarding the risks from non-professional use of imidacloprid:

“Provado® Garden is authorised in The Netherlands for uses in pome fruit, ornamentals and lawns. Concerns were raised by Ctgb whether the restriction to pre-flowering applications in pome fruits, as established for the agronomic uses (i.e. BBCH 10, mouse-ear stage), will reliably be respected by non-professionals. In order to address this question, Bayer CropScience has prepared a document (5.1.2.e 128; date: 04 MAR 2005), proposing a less and a more stringent wording as well as an illustration of the restriction to pre-flowering and post-flowering, i.e. when Provado® Garden can be used by non-professionals. Particularly the more stringent wording and illustration, as proposed in document 5.1.2.e 128, is considered to enable every non-professional to identify the crop stage where application of Provado® Garden is possible, considering honey bees foraging on flowering apple or pear trees. As

such, Bayer CropScience is convinced that with an appropriate label in combination with an intuitive and illustrative user manual (e.g. illustration of growth stages as proposed in document 5.1.2.e 128 or illustration of situations where and when, respectively where and when not to apply), Provado® Garden can be used in pome fruit and ornamentals without adverse effects on honey bees. Moreover, it needs to be considered that potentially treated areas are small-scaled and as such deliver much less forage to bee colonies than e.g. commercial orchards, which require bee colonies to get hold of other pollen and nectar sources, which finally results in a dilution of potential residues at the hive level.

This holds also true for the question raised by Ctgb with regard to potentially flowering weeds around treated areas in house gardens.

Concerns were also raised with regard to the application of Provado® Garden to lawns. Bayer CropScience is convinced that also this use does not pose an unacceptable risk to bees, based on the risk assessment of Merit® Turf and the knowledge that the lawn use is commercialized as a specific product, which is mainly bought by consumers who will take proper care of their lawn. Furthermore, the use on private lawns is considered small scale in comparison to the Merit® Turf application.

When considering in addition the findings of Mayer and Lunden (1997; Doc.-No.: 110179-01-1) who applied imidacloprid at 112 g a.s./ha in an apple orchard with 10% open bloom and additionally with on average 6 flowering dandelions per m² understorey with no impact on honey bee mortality, in combination with the negligible phloem mobility of imidacloprid, **it can be concluded that risk for bees in house gardens from the use of Provado® Garden in pome fruit, ornamentals and lawns can be effectively mitigated by appropriated label instructions.**

Response Ctgb

Residues in flowering crops

The risk via flowering crops is indeed expected to be low for the professional uses in apple, pear and grass fields.

The field studies in apple orchards showed that effects are acceptable when orchards are sprayed at the mouse-ear stage (about 3-4 weeks before full flowering) or after flowering. To instruct non-professional users, the applicant has provided an instruction leaflet with pictures, indicating at which stages Provado Garden can be applied on apple and pear trees.

Considering the large variety in ornamentals, it is not possible to instruct the non-professional user with pictures on the correct application time before flower buds are visible. Therefore, these uses should be restricted to post-flowering only. Thus, the label should be revised (only relevant use shown):

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel:

in siergewassen in de tuin, met dien verstande dat toepassing alleen is toegestaan na de bloei.

Voorstel College: instemmen met wijziging WG/GA

NB Dit moet worden opgenomen in het advies aan Staatssecretaris Bleker, wordt geen besluit.

Residues in flowering weeds, succeeding crops, honeydew, guttation – geen bespreekpunten

B. Biocides

B.1.1 Professional uses against flies : Lurectron flybait, Quick bait, Quick bait spray

Geen bespreekpunt

B.1.2 Professional uses against ants: Maxforce Quantum

The applicant was requested to address this risk and they propose a label restriction which will exclude application of the gel on places accessible for bees. The Instructions for Use were adapted accordingly. With this restriction, exposure to bees can be excluded and the risk is acceptable.

Voorstel College: instemmen met wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder

B.1.3 Professional uses against cockroaches: Maxforce prime, Maxforce White IC

Geen bespreekpunt

B.2 Non-professional uses BAYTHION MIERENMIDDEL N, VAPONA RAAMSTICKER, VLIEGENSTICKER

Geen bespreekpunt

Public literature:

The above risk assessment, based on protected data from the applicant, indicates that the risks of the proposed uses of imidacloprid in general are acceptable, provided that restrictions are mentioned on the labels . In this section it will be considered whether studies available in the public literature domain confirm or contradict the risk assessment as shown above. A preliminary result of a public literature survey is used. The included public references are presented in Annex II.

Based on the available information it cannot be concluded that there is a link between imidacloprid and the relatively high winter mortality in honeybee colonies observed in the Netherlands in recent years. Clearly, bee decline is caused by (an interaction of) a number of factors. There is currently no evidence that imidacloprid or other neonicotinoid products significantly contribute to bee decline based on public literature. It should be noted that other (European and elsewhere) countries have not taken such steps either (with some exceptions where clear acute bee poisoning due to suboptimal sowing circumstances was observed; this has not been the case in the Netherlands).

In the 'Inclusion Directive' of imidacloprid it is suggested that a monitoring programme may be required to further investigate the role that neonicotinoid substances play in bee decline. Recently, a study has been started by bijen@wur to investigate the long-term effects on honeybee colonies of chronic sublethal exposure to imidacloprid in relation to the vitality of honeybee colonies. Therefore, further monitoring is currently not required.

Algemene conclusie Imidacloprid:

Zie onderstaande tabel voor overzicht acties College.
P.M. Collegebesluiten per middel volgen.

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid

toelatingnr	middelnaam	toelatinghouder	toepassing	formulering	Toepassing(en)	College
12942	ADMIRE O-TEQ	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Olie dispersie	Gewasbehandeling in appel en peer, vruchtgroenten onder glas, bloemisterijgewassen buiten en onder glas, bloembol- en bloemknol, boomkwekerij en vaste planten, hop, pennenteel van witlof.	Wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder
11483 (parallel: 11547, 13363)	ADMIRE	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in appel en peer, vruchtgroenten onder glas, bloemisterijgewassen buiten en onder glas, bloembol- en bloemknol, boomkwekerij en vaste planten.	Wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder
13178	ADMIRE	LTO Nederland	Professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Traybehandeling (kort voor planten) of fytodrip (bij zaaien) in spruitkool, bloemkool en broccoli.	Toelating loopt binnenkort af op 1 augustus 2011, geen actie
13059	MONAMI	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat	Aardappelen, grondbehandeling tijdens poten.	Wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder
11662	AMIGO FLEX	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Suspensie concentraat voor zaadbehandeling	Aardappelen, grondbehandeling tijdens poten.	Wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder
13321	MERIT TURF	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Granulaat	Strooien in grasvegetatie en graszodenteelt.	Geen wijziging in huidige toelating
11455	GAUCHO	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in suiker- en voederbieten.	Geen wijziging in huidige toelating
11601	GAUCHO ROOD	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling	Zaadcoating in mais.	Geen wijziging in huidige toelating
12341	GAUCHO TUINBOUW	Bayer CropScience B.V.	Professioneel	Water dispergeerbaar poeder voor	Zaadcoating van sla, andijvie, kolen, prei.	Wijziging WGGa op verzoek toelatinghouder

				vochtige zaadbehandeling		
11998 (afgeleide: 12219)	ADMIRE N PIN	Bayer CropScience B.V.	Niet- professioneel	Plantenstaafje	Sierplanten in potten en bakken.	Geen wijziging in huidige toelating
12115 (afgeleides: 12945, 12919)	PROVADO GARDEN	Bayer CropScience B.V.	Niet- professioneel	Water dispergeerbaar granulaat	Gewasbehandeling in siergewassen en appels en peren of particuliere boomgaard, en aangietbehandeling in gazon.	advies mbt wijziging van WG/GA op verzoek toelatinghouder

Biociden op basis van imidacloprid

toelatin gnr	middelnaa m	toelatinghoud er	toepassin g	formulering	Toepassing(en)	College
13160 (afgeleid e: 13173)	LURECTRO N FLYBAIT	Denka Registrations B.V.	Profession eel	Granulaat	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverslijfplaatsen.	Geen wijziging in huidige toelating
12665 (afgeleid e: 13063)	QUICK BAYT	Bayer CropScience B.V.	Profession eel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Tegen vliegen. Korrels om op te lossen en dan op oppervlakten te smeren in dierverslijfplaatsen.	
13116	QUICK BAYT SPRAY	Bayer CropScience B.V.	Profession eel	Water dispergeerb aar granulaat	Tegen vliegen. Middel verspuiten op oppervlakten waar vliegen vaak zitten. Dierverslijfplaatsen en opslagplaatsen.	
13074	MAXFORC E QUANTUM	Bayer CropScience B.V.	Profession eel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Tegen mieren. Gel (visceuze druppels), met een pistool binnen of buiten, in nesten of op looppaden aan te brengen.	Wijziging WGGA op verzoek toelatinghouder
13250	MAXFORC E PRIME	Bayer CropScience B.V.	Profession eel	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen en transportmiddelen. Gel aanbrengen in kieren en spleten.	Geen wijziging in huidige toelating
12094	MAXFORC E WHITE IC	Bayer CropScience B.V.	Profession eel	lokaas	Bestrijding van kakkerlakken in gebouwen en transportmiddelen. Gel aanbrengen in kieren en spleten.	
13055 (afgeleid es:	PIRON MIERENLO KDOOS	Bayer CropScience B.V.	Profession eel & Niet- profession	Lokmiddel (klaar voor gebruik)	Mierenlokdoos. Zowel buiten als binnen.	Geen wijziging in huidige toelating

13104, 13127, 13073, 13072, 13121, 13124)			eel			
12952 (afgeleides: 13026, 12974, 13052, 12979, 12980, 12024)	BAYTHION MIERENMI DDEL N	Bayer CropScience B.V.	Profession eel & Niet- profession eel	Granulaat	Korrels om bij mierennest te strooien. Alleen buiten.	Geen wijziging in huidige toelating
13280 (parallel: 13351)	VAPONA RAAMSTIC KER	Sara Lee Household and Body Care NL B.V.	Niet- profession eel	Diversen	Sticker tegen vliegen. Binnenshuis.	Geen wijziging in huidige toelating
13369	VLIEGENST ICKER	Bayer CropScience B.V.	Niet- profession eel	Diversen	Sticker tegen vliegen. Binnenshuis.	Geen wijziging in huidige toelating