Decis Protech
25001258 NLWG
Bayer Cropscience SA-NV

Please note that there are no changes proposed to the WG

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Pootaardappel	Kevers[1]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	-	7
	Bladluis (aardappelbladrolvirus = PLRV-virus)[2], bladluis[4]	0,66 L/ha	0,66 L/ha	1 per teeltcyclus		-	
	Bladluis (Y-virus)[3], bladluis[4]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	3 per teeltcyclus		14	
Consumptie- en zetmeelaardappel	Kevers[1]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	-	7
	Bladluis[4]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	3 per teeltcyclus			
Bieten	Trips[5], rupsen[6]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcycl	-	30

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Granen	Bladluis[7]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per teeltcyclus	0,84 L/ha per teeltcyclus	14	30
Peulvruchten m.u.v. lupine en sojaboon	Bladrandkever[9], trips[5,10,19], rupsen[11]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	7
Veldboon (peulvrucht)	Bladrandkever[9], trips[5,10,19], rupsen[11]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	7
Karwij	Rupsen[15]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	1 per teeltcyclus	0,33 L/ha per teeltcyclus	-	45
Vlas (Lijnzaad en vezelvlas)	Trips[5,14,19]	0,5 L/ha	0,5L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	60
Koolzaad	Kevers[16,17]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	1 per teeltcyclus	0,33 L/ha per teeltcyclus	-	45

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Teff	Bladluis[7]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per teeltcyclus	0,84 L/ha per teeltcyclus	14	30
Cultuurgrasland	Vliegen en muggen[12]	0,42 l/ha	0,42 l/ha	2 per 12 maanden	0,84 L/ha per 12 maanden	14	14
Aardbei (onbedekte teelt)	Trips [5,14,19], rupsen[6, 20 ,21 ,22 ,23 ,24,34], aardbeibloesemkever[25]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,2 L/ha	2 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	14	3
Aardbei (bedekte teelt)	Trips [5,14,19], rupsen[6, 20 ,21 ,22 ,23 ,24,34], aardbeibloesemkever[25]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	0,66 L/ha per 12 maanden	14	3
Aalbes (onbedekte teelt)	Rupsen [20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,27], wantsen[29]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus	0,8 L/ha per 12 maanden	14	7
Kruisbes (onbedekte teelt)	Rupsen [20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,27], wantsen[29]	0,033% (33 ml /100 L	0,4 L/ha	2 per teeltcyclus	0,8 L/ha per 12 maande	14	7

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
		water)			n		
Braam (onbedekte teelt)	Aardbeibloesemkever[25]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	14	7
Framboos (onbedekte teelt)	Aardbeibloesemkever[25]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	14	7
Sla (*Lactuca* spp.) (onbedekte teelt)	Rupsen[6,32,33,34]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,66 L/ha	2 per 12 maanden	1,32 L/ha per 12 maanden	7	7
Peulgroenten incl. edamame (onbedekte teelt)	Bladrandkever [9], trips [5,10,19], rupsen[11]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	7
Vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil (bedekte teelt)	rupsen[6,33,35], wittevlieg[36], trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	1,17 L/ha	3 per 12 maanden	3,5 L/ha per 12 maanden	7	3

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Meloen (bedekte teelt)	Rupsen[6,33,35], wittevlieg[36], trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	1,17 L/ha	3 per 12 maanden	3,5 L/ha per 12 maanden	7	3
Aubergine (bedekte teelt)	Rupsen[6,33,35], wittevlieg[36], trips[19].	0,083% (83 ml /100 L water)	1,17 L/ha	3 per 12 maanden	3,5 L/ha per 12 maanden	7	3
Tomaat (bedekte teelt)	Rupsen[6,33,35], wittevlieg[36], trips[19].	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	2,5 L/ha per 12 maanden	7	3
Paprika (bedekte teelt)	Rupsen[6,33,35], wittevlieg[36], trips[19].	0,083% (83 ml /100 L water)	1,17 L/ha	3 per 12 maanden	3,5 L/ha per 12 maanden	7	3
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Rupsen[6,32,35,37,38]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	7	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Rupsen[6,32,35,37,38]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Koolrabi	Rupsen[6,32,35,37,38]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12	1 L/ha	14	7

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
(onbedekte teelt)				maanden	per 12 maanden		
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	Rupsen[6], trips[5,10,14,19]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Knolraap (onbedekte teelt)	Rupsen[6], trips[5,10,14,19]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Koolraap (onbedekte teelt)	Rupsen[6], trips[5,10,14,19]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Ui-achtigen m.u.v. bosuien (onbedekte teelt)	preimot[39], mineervlieg[40], trips[5,10,14,19]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Asperge (onbedekte teelt)	kevers[41], vliegen en muggen[42]	0,5 L/ha na de oogst	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Prei (onbedekte teelt)	preimot[39], mineervlieg[40], trips[5,10,14,19]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	14	7
Eetbare paddenstoelen	Vliegen en muggen[43,44]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha	14 (3 dagen voor de eerste vlucht en 3 dagen voor de tweede vlucht)	3
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Dopluis[45], schildluis[46]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	0,66 L/ha	7	-
Gladiool (onbedekte teelt)	Thrips[47]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha	-	
Tulp, hyacint en lelie (onbedekte teelt)	Bladluis (virus)[3]	0,67	0,67 L/ha	2 per 12 maanden	1,34 L/ha	7	
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Rupsen[6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56], mineervlieg[37, 40], trips[5, 10,14,19,47], wittevlieg[36], dopluis[45], schildluis[46]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	2,5 L/ha per 12 maanden	7	-

Commented [5.1.2.e]: Dit lijkt op gebruik 56 in de GAP qua dosering. Die heet echter breed: ornamentals

Onder welke GAP regels vallen de gladiolen, tulp, vaste planten, etc etc?
Onder 29, zo te zien
En onder 30 de boomkwekerijgewassen (die in WG zijn uitgesplitst naar laanbomen en overige bk gewassen)

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Rupsen[6,32,33,35], mineerviieg[37, 40], trips[5,10,14,19,47], wittevlieg[36], dopluis[45], schildluis[46]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	2,5 L/ha per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Rupsen [6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56], trips[5,10,14,19]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,25 L/ha	3 per 12 maanden	0,75 L/ha per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Rupsen[6,32,33,35], mineervlieg[37, 40], trips[5,10,14,19,47], wittevlieg[36], dopluis[45], schildluis[46]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	2,5 L/ha per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

[1] Colorado kever (*Leptinotarsa decemlineata*)

[2] Bladluis ter voorkoming van persistent virus

[3] Bladluis ter voorkoming van non persistent virus

[4] Aardappeltopluis *(Macrosiphum euphorbia)*

[5] Vroege akkertrips (*Thrips angusticeps*)

[6] Gamma uil *(Autographa gamma)*

[7] Grote graanluis (*Sitobion avenae*), Vogelkersluis (*Rhapolasiphum padi*), Roos-grasluis (*Metopolophium dirhodum*)

[9] Bladrandkever (*Sitona lineatus*)

[10] Erwten trips (*Kakothrips robustus*)

[11] Erwtenpeulboorder (*Laspeyresia nigricana*)

[12] Rouwvlieg (*Bibio marci, Bibio hortulanus, Dilophus febrillis*)
[14] Vlas trips (*Thrips linarius*)
[15] Karwijmot (*Depressaria daucella*)
[16] Koolzaadglanskever (*Meligehtes aeneus*)
[17] Koolzaadsnuitkever(*Ceuthorrhynchus assimilis*)
[19] Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
[20] Anjerbladroller (*Cacoecimorpha pronubana*)
[21] Azalea bladroller (*Acleris laterana)*
[22] Brandnetelbladroller (*Olethreutes lacunana*)
[23] Koolbladroller (*Clepsis spectrana*)
[24] Agaatvlinder (*Phlogophora meticulosa)*
[25] Aardbeibloesemkever (*Anthonomus rubi*)
[26] Vruchtbladroller (*Adoxophyes orana*)
[27] Wintervlinder (*Operopthera brumata*)
[29] Groene appelwants (*Lygus pabulinus*)
[32] Koolwitje (*Pieris* spp.)
[33] Groente-uil (*Polia oleracea*)
[34] Koolmotje (*Plutella xylostella*)
[35] Turkse mot (*Chrysodeixis calchites*)
[36] Koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)
[37] Bladmineerders (*Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae*)
[38] Late koolmot (*Evergestis forvi-calis*)
[39] Preimot (*Acrolepiopsis assectella*)
[40] Uienmineervlieg (*Liriomyza cepae*)
[41] Aspergekever (*Crioceris asparagi*)
[42] Aspergevlieg(*Platyparea poeciloptera*)
[43] Champignonvlieg (*Megaselia halterata*)
[44] Varenrouwmug (*Sciaridae*)
[45] Dopluizen (*Coccodae*)
[46] Schildluizen (*Coccidae)*
[47] Gladiolentrips (*Thaeniothrips simplex*)
[49] Wintervlinder (*Operopthera brumata*)
[50] Bastaardsatijnvlinder (*Euproctis chrysorrhoea*)
[51] Ringelrupsvlinder (*Malacosoma Neustria*)
[52] Satijnvlinder (*Leucoma salicis*)
[53] Stippel en spinsel motten (*Yponomeura* spp.)

[54] Plakker (*Lymantria dispar*)
[55] Jeneverbesmineermot (*Argyresthia trifasciata*)
[56] Kastanjemineermot (*Cameraria ohridella*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Maïs	Gewasbehandeling	Rupsen[57]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden		30
Lupine, veldboon (peulvrucht en voedergewas)	Gewasbehandeling	Trips[19], Kevers[9], Rupsen[11]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden		7
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[59]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per 12 maanden	14	14
Blauwmaanzaad, Mosterd, Teunisbloem, Huttentut	Gewasbehandeling	Sikkelmotten[60]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	1 per 12 maanden		60
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	Trips[61]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden		60
Witlof (pennenteelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[62]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	14	14
Chicorei	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[62]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Boekweit	Gewasbehandeling	Luizen[63]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	14	30

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sorghum, gierst	Gewasbehandeling	Luizen[63], Rupsen[64]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden		30
Quinoa	Gewasbehandeling	Bladluis[7]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per 12 maanden	14	30
Bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[64], Wants[65]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Druiven (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Cicaden[66], kevers[68, 69], rupsen[70]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Dauw-bramen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Kevers[25], rupsen[64]	0,033% (33 ml /100 L water)	0,4 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Veldsla, rucola (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6,32,33, 34]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	2 per 12 maanden	7	14
Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6,32,33, 34]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	2 per 12 maanden	7	14
Pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6,33,35], Wittevlieg[36], Trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	1,17 L/ha	3 per 12 maanden	7	3

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Courgette (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[64]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden		3
Tomatilo (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6,33,35], Wittevlieg[36], Trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	7	3
Radijs (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6], Trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	2 per 12 maanden	7	7
Wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[62]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Aardpeer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[62]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vliegen en muggen[62]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Bosuien (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[39], Mineervlieg[70], Trips[61]	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6, 32, 33, 34]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per 12 maanden	7	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[6, 32, 33, 34]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	2 per 12 maanden	7	14
Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Wortelvlieg[62]	0,42 L/ha	0,42 L/ha	2 per 12 maanden	14	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Rupsen[64]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Laanbomen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips[61], Rupsen[64], Mineervlieg[70]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen), heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en –struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling, neerwaarts spuiten	Trips[61], Rupsen[64], Mineervlieg[70]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Vaste planten teelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Trips[61], Rupsen[64], Mineervlieg[70]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Mineervlieg[37,40], Rupsen[6,32,33,35], Wittevlieg[36], Trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	7	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeitcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemenzaadteelt (onbedekt)	Gewasbehandeling	Rupsen[64]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Mineervlieg[37,40], Schildluis[46], Rupsen[6,32,33,35],Wittevlieg[36], Trips[19]	0,083% (83 ml /100 L water)	0,83 L/ha	3 per 12 maanden	7	
Onbedekte teelt van: Veredeling en groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff.	Gewasbehandeling	Trips[61], Rupsen[64], Mineervlieg[70]	0,33 L/ha	0,33 L/ha	2 per 12 maanden	7	

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

[6] Gamma uil *(Autographa gamma)*

[7] Grote graanluis (*Sitobion avenae*), Vogelkersluis (*Rhapolasiphum padi*), Roos-grasluis (*Metopolophium dirhodum*)

[9] Bladrandkever (*Sitona lineatus*)

[11] Erwtenpeulboorder (*Laspeyresia nigricana*)

[19] Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

[25] Aardbeibloesemkever (*Anthonomus rubi*)

[32] Koolwitje (*Pieris* spp.)

[33] Groente-uil (*Polia oleracea*)
[34] Koolmotje (*Plutella xylostella*)
[35] Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)
[36] Koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)
[37] Bladmineerders (*Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae*)
[39] Preimot (*Acrolepiopsis assectella*)
[40] Uienmineervlieg (*Liriomyza cepae*)
[46] Schildluizen (*Coccidae*)
[57] Maïsstengelboorder (*Ostrinia nubilalis*)
[59] Larven van de zwarte vlieg (*Bibionidae*)
[60] Sikkelmotten (*Depressaria* spp.)
[61] Trips (*Thysanoptera*)
[62] Wortelvlieg (*Psila rosae*)
[63] Luizen (*Aphis* spp.)
[64] Rupsen (Lepidoptera)
[65] Blindwants (Miridae)
[66] Cicaden (*Scaphoideus titanus, Erythroneura comes*)
[68] Twijgafsteker (*Rhynchites caeruleus*)
[69] Grote sigarenmaker (*Byctiscus betulae*)
[70] Aardbeidbladroller (*Sparganothis pilleriana*)
[71] Mineervlieg (*Liriomyza* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,0375 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.
Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.

In de onbedekte teelt van suikermais, lupine, veldboon, graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras, blauwmaanzaad, mosterd, teunisbloem, huttentut, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), chicorei, boekweit, sorghum, gierst en quinoa het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.
In de onbedekte teelt van bessen m.u.v. aalbes en kruisbes, druiven, en dauw-bramen het middel toepassen in 1000 tot 1200 liter water per ha.
In de bedekte teelt van pompoen-achtigen en watermeloen het middel toepassen in 600 tot 1400 liter water per ha.
In de bedekte teelt van tomatillo het middel toepassen in 600 tot 1000 liter water per ha.

Commented [512e]: Blijkbaar maar zeer weinig noodzaak om zinnen ter bescherming van waterorganismen voor te schrijven

Dat zou betekenen dat voor de te herbeoordelen gewassen er ook alleen maar DRT75 nodig is?

Behandelde vezelgewassen (en bijproducten zoals lijnzaad) niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Behandelde medicinale kruid- en wortelgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

In de teelt van **aardbei, braam en framboos** mag het middel uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen (BBCH 57).

In de teelt van **bessen, druiven en dauw-bramen** mag het middel uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen (BBCH 57) en vanaf het einde van de bloei (BBCH 69) tot het begin van de rijping (BBCH 81).

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen, en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **bessen, druiven, braam, framboos en dauw-braam,** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 450 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij/struikrij of de laatste boom/struik in de rij tot aan de perceelgrens).

Commented [5.1.2.e]: Deze is het zelfe gebleven bij de herbeoordeling

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de onbedekte teelt van **aardappel** (3x0,33 L/ha), **granen, teff, graszaad, quinoa** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van aardbei** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD90% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / de perceelgrens).
- Een veldspuit met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme

Commented [5.1.2.e]: Waarom? Het is een NDA zin en geen waterorganismen

kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van vaste planten, bloembol en bloemknol-gewassen, boekweit, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen (excl. laanbomen, neerwaarts gespoten), bloemenzaad, veredeling en zaadteelt** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD50% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van laanbomen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotige / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van opzetters** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van spillen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van sla, tulp, hyacinth, lelie en medicinale kruidgewassen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% met een tophoek van maximaal 90° met bijbehorende driftarme kantdop en een spuitdopafstand van 25 cm in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 30 cm; of
- Een veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en

Commented [5.1.2.e]: Individuele technieken. Omdat het hier niet om een waterorganismen zin gaat kan daar nu denk ik niets aan omgezet/gewijzigd worden

Commented [5.1.2.e]: Zou dat toch navragen, aangezien we het bij een NLKUG wel doen.

Commented [5.1.2.e]: Waarom? Het is een NDA zin en geen waterorganismen

Commented [5.1.2.e]: Hier moet ip 150 cm bij voor water tenzij de originele beoordeling al rekening heeft gehouden met 100 cm TVZ ipv 150 cm TVZ, of als de DRT97.5 een heel grote overkill is tov wat nodig is voor water (bv als DRT90 al genoeg was). Nazoeken in originele toelating

Commented [5.1.2.e]: De zi is niet voor water dus de 150 cm is ook niet nodig

Commented [5.1.2.e]: Hier moet ip 150 cm bij voor water tenzij de originele beoordeling al rekening heeft gehouden met 100 cm TVZ ipv 150 cm TVZ, of als de DRT97.5 een heel grote overkill is tov wat nodig is voor water (bv als DRT90 al genoeg was). Nazoeken in originele toelating

bijbehorende driftarme kantdop bij een rijsnelheid van maximaal 8 km/u

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **bloemkoolachtigen, koolrabi, radijsachtigen, knolraap, koolraap, ui-achtigen, prei, sluitkoolachtigen, witlof, chicorei, wortelgewassen m.u.v. wortel, aardpeer, Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, bosuien, medicinale wortelgewassen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD 75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Voor onbedekte teelten: gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
Voor bedekte teelten: gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit
middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent
van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof deltamethrin. Deltamethrin behoort tot de pyrethroiden. De IRAC code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Commented [5.1.2.e]: Ik vraag mij af of we dit nu nog accepteren. Is oude stijl met individuele technieken. Waarschijnlijk is dat erop gekomen vanwege NDA. Die worden nu niet herbeoordeeld en de vraag is of we nu dan wel 'de regel' mogen toepassen dat alle besluiten AB proof de deur uitgaan. Het is mi wel wenselijk om dit om te zetten naar DRT klassen.

Sowieso moet vg mij de 150 cm erop komen voor sla (intensief gespoten gewas), maar aangezien vanuit de fate beoordeling DRT75 genoeg is, hoeft dat niet

(vg mij had waterorganismen er iig voor sla niet bij hoeven te staan – de andere gewassen heb ik niet gecheckt)